



OriginElle

Clinique de fertilité et centre de santé de la femme



APRÈS VOTRE PRÉLÈVEMENT CHIRURGICAL DE SPERMATOZOÏDES

Les incisions devraient guérir facilement après la chirurgie, mais vous avez probablement des questions concernant ce qui suit.

Rétablissement immédiat après la chirurgie

Étant donné que les effets de l'anesthésie pourraient persister une bonne partie de la première journée, vous n'aurez pas le droit de conduire pour retourner à la maison. Veuillez prévenir la Clinique OriginElle si vous continuez à ressentir les effets de l'anesthésie après la première journée. Nous vous conseillons également de rester au lit la journée de l'intervention afin de minimiser la pression sur l'incision. L'application de glace pendant les 24 premières heures aidera à diminuer l'enflure. Appliquez de la glace pendant 20 minutes et ce, à des intervalles de 20 minutes.

La douleur

Il est normal de ressentir un certain inconfort suite à l'intervention. Une fois de plus, l'application de glace reconfortera la douleur. On pourrait vous prescrire un médicament contre la douleur pour minimiser le malaise. Notez qu'une augmentation de la douleur, surtout après la deuxième journée, n'est pas normale.

Les soins de la plaie

L'incision ne requiert pas de soin particulier, mais elle doit demeurer propre et sèche. Vous pourrez enlever tout grand pansement de gaze demain et prendre une douche après 24 heures. Tout petit pansement ou pansement très collant tombera normalement par lui-même ou il pourra être retiré en moins d'une semaine. Les points de suture tomberont tout seul et ils n'ont pas à être enlevés.

Bien que les infections soient peu fréquentes, vous devez tout de même prendre connaissance des symptômes à savoir, un écoulement épais provenant de l'incision, une fièvre, une augmentation de la rougeur ou de l'enflure de l'incision et/ou une augmentation de la douleur. Contactez votre médecin si vous ressentez l'un de ces symptômes.

Notez qu'un saignement actif de l'incision n'est pas normal.

Pour les deux prochaines semaines

Les deux premières semaines suivant votre chirurgie, vous pourrez prendre des douches, mais vous devez éviter les bains et les piscines. Il est également conseillé de porter des caleçons plutôt que des « boxers » pendant les deux premières semaines après l'intervention.

Le suivi

Une consultation de suivi n'est généralement pas nécessaire, mais si vous avez des inquiétudes concernant votre chirurgie, veuillez communiquer avec votre urologue ou contactez la Clinique OriginElle au 514.369.0688.