

APRÈS VOTRE PRÉLÈVEMENT D'OVULES POUR LA FIV

Il est possible que vous ressentiez un certain inconfort au niveau de l'abdomen. Il est donc conseillé de prendre du Tylenol® pour soulager la douleur. À ce sujet, vous pouvez demander à votre médecin de vous prescrire du Tylenol® contenant de la codéine. Vous devriez être apte à reprendre vos activités normales le jour suivant votre prélèvement d'ovules cependant, il est conseillé d'éviter toutes activités intenses.

L'anesthésie que vous aurez eue pourrait causer des nausées suite à la procédure. Nous vous recommandons de manger légèrement pour le reste de la journée et d'éviter les mets trop épicés et/ou trop gras jusqu'à votre rétablissement. Veuillez informer le personnel de la Clinique OriginElle si les symptômes durent plus qu'une journée.

Il est, également, possible que vous ayez des saignements vaginaux après le prélèvement. Normalement, ceci diminuera et devrait cesser dans les 48 heures suivant le prélèvement. Veuillez informer le personnel de la Clinique OriginElle si les saignements persistent, deviennent abondants ou nauséabondes.

Les infections sont inhabituelles, mais il est important que vous preniez connaissance des symptômes, à savoir : fièvre et/ou fièvre persistante, douleurs abdominales de plus en plus intenses. Pour minimiser les risques d'infections vaginales, évitez les relations sexuelles, l'usage de tampons, les douches vaginales, les bains et les baignades durant une semaine (la douche est permise). En effet, durant cette période de guérison, vous serez vulnérable aux infections de bactéries entrant dans le vagin.

Finalement, sachez que les symptômes tels que la nausée, les vomissements, la diarrhée ou l'urine concentrée (de couleur jaune foncé) sont anormaux. Vous devez dès lors contacter le personnel de la Clinique OriginElle si l'un de ces symptômes est présent. Rappelez-vous que serez très fertile à ce moment. Utilisez, donc, un moyen de contraception fiable jusqu'à votre prochain cycle menstruel.

PRÉPARATION EN VUE DE VOTRE TRANSFERT D'EMBRYONS

Vous devriez déjà être en train de prendre de l'acide folique (de 0.4 mg à 5 mg par jour dépendamment de votre prescription). Si ce n'est pas le cas, commencez dès aujourd'hui.



OriginElle

Clinique de fertilité et centre de santé de la femme



À PARTIR DU JOUR DE VOTRE PRÉLÈVEMENT D'OVULES

Médicaments	Dose	Voie d'adm.	Fréq.	Durée	Recommandation
Doxycycline	100 mg	Voie orale	BID	x 7 jours	<ul style="list-style-type: none">À prendre avec repas.Ne pas prendre des vitamines ou du lait en même temps.
Medrol	16 mg	Voie orale	QD	x 4 jours	---
Endometrin	100 mg	Voie vaginale	TID	x 10 semaines	<ul style="list-style-type: none">Insérez profondément dans le vagin et reposez-vous pendant 15 à 20 minutes.Le jour du transfert d'embryons, prenez votre dose au moins 4 heures avant la procédure.
Estrace	2 mg	Voie orale	TID	x 10 semaines	<ul style="list-style-type: none">Avec ou sans repas.Exemple : 7h00 – 15h00 – 23h00 ou 8h00 – 16h00 – 00h00

LE JOUR DU TRANSFERT D'EMBRYONS

La procédure sera facilitée si votre vessie est pleine. Si vous devez vider votre vessie avant la procédure, buvez deux à trois verres immédiatement.

Vous pouvez contacter la Clinique OriginElle au 514.369.0688 si vous éprouvez l'un des symptômes mentionnés précédemment.

La date de votre rendez-vous pour le test de grossesse est _____, soit le 16^e jour après votre prélèvement d'ovules.